

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.
Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäß Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, des Apothekers oder des Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

PHYTOMED *Strophantinum comp., Tabletten*

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird PHYTOMED Strophantinum comp. angewendet?

Gemäß homöopathischem Arzneimittelbild kann PHYTOMED Strophantinum comp. bei nervösen Herzbeschwerden mit Herzstichen und Herzklopfen infolge seelischer Erregungen und bei geistiger oder körperlicher Überanstrengung angewendet werden. Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht ausschließlich auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob PHYTOMED Strophantinum comp. gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf PHYTOMED Strophantinum comp. nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Wenn unregelmässiger Puls, starkes Herzklopfen, stechende Schmerzen in der Brustgegend und Atemnot plötzlich auftreten oder länger andauern, ist die Konsultation eines Arztes oder einer Ärztin angezeigt. Sie werden feststellen, ob das Herz oder die Gefäße organisch erkrankt sind oder ob die Beschwerden nervös bedingt sind.

Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren soll das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin angewandt werden.

PHYTOMED Strophantinum comp. darf nicht bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe angewendet werden.

Bitte nehmen Sie PHYTOMED Strophantinum comp. erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden. Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden.

Darf PHYTOMED Strophantinum comp. während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, den Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, die Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

PHYTOMED *Strophantinum comp., comprimés*

Médicament homéopathique

Quand PHYTOMED Strophantinum comp. est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, PHYTOMED Strophantinum comp. peut être utilisé en cas de troubles cardiaques nerveux avec élancements et palpitations du cœur, suite à des émotions affectives et au surmenage intellectuel et physique.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si PHYTOMED Strophantinum comp. peut être utilisé simultanément.

Quand PHYTOMED Strophantinum comp. ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

En cas d'apparition subite ou prolongée d'un pouls irrégulier, de fortes palpitations cardiaques, de douleurs lancinantes dans la poitrine et de dyspnée, il convient de consulter votre médecin qui constatera si ces troubles sont dus à une affection cardio-vasculaire ou sont d'origine nerveuse.

Chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans, utiliser le médicament uniquement après consultation de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

PHYTOMED Strophantinum comp. ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'un des composants du remède.

Si votre médecin vous a informé(e) que vous avez une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre PHYTOMED Strophantinum comp.. Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

PHYTOMED Strophantinum comp. peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments pendant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenerne il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

PHYTOMED *Strophantinum comp., compresse*

Medicamento omeopatico

Quando si usa PHYTOMED Strophantinum comp.?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicamenti omeopatici PHYTOMED Strophantinum comp. può essere usato in caso di disturbi cardiaci nervosi con fitte al cuore e palpazioni conseguenti a eccitazione psichica e in caso di sovraccarico intellettuale o fisico.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicamenti, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare PHYTOMED Strophantinum comp..

Quando non si può usare PHYTOMED Strophantinum comp. e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Se accusate improvvisamente un polso irregolare, forti palpazioni, dolori pettorali lancinanti e affanno o se uno di questi disturbi dovesse protrarsi, si consiglia di consultare un medico. Questo potrà determinare se il cuore o i vasi sanguigni sono affetti da una malattia organica oppure se tali disturbi sono unicamente di origine nervosa.

Nei bambini e negli adolescenti ai 18 anni, il medicamento può essere utilizzato solo previa consultazione con il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere. PHYTOMED Strophantinum comp. non si può usare in caso di ipersensibilità a uno dei costituenti del preparato.

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere PHYTOMED Strophantinum comp..

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicamenti o fa uso di medicamenti per uso esterno (anche acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare PHYTOMED Strophantinum comp. durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicamenti durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Wie verwenden Sie PHYTOMED Strophanthinum comp.?

Falls vom Arzt oder von der Ärztin nicht anders verschrieben, für Erwachsene: 3-mal täglich 1–2 Tabletten sowie bei akuten Beschwerden alle 15 Minuten 1 Tablette im Mund zergehen lassen, maximal 12-mal täglich.

Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren soll das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin angewandt werden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes/Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann PHYTOMED Strophanthinum comp. haben?

Für PHYTOMED Strophanthinum comp. sind bisher bei bestimmungsgemässem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie PHYTOMED Strophanthinum comp. ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15–25°C) lagern.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in PHYTOMED Strophanthinum comp. enthalten?

1 Tablette à 675 mg enthält:

Wirkstoffe

Kalium carbonicum (HAB) D6 (HAB 7) 5 mg, Kalmia latifolia (HAB) D4 (HAB 7) 5 mg, Nitroglycerinum (Glonoinum) (HAB) D6 (HAB 7) 5 mg, Ouanbainum (g-Strophanthinum) D4 (HAB 5a, HAB 7) 5 mg, Selenicereus grandiflorus (HAB) D1 (HAB 7) 5 mg, Spigelia anthelmia (HAB) D4 (HAB 7) 5 mg.

Hilfsstoffe

Lactose-Monohydrat 628 mg, Maisstärke, Talk, Magnesiumstearat.

Zulassungsnummer

47721 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie PHYTOMED Strophanthinum comp.? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packungen à 100 Tabletten.

Zulassungsinhaberin und Herstellerin

PHYTOMED AG, CH-3415 Hasle/Burgdorf

Diese Packungsbeilage wurde im Dezember 2023 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Comment utiliser PHYTOMED Strophanthinum comp.?

Sauf prescription contraire du médecin, adultes: laisser fondre 1–2 comprimés dans la bouche 3 fois par jour; en cas de douleurs aiguës 1 comprimé toutes les 15 minutes, jusqu'à 12 fois par jour.

Chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans, utiliser le médicament uniquement après consultation de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Veuillez-vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant/l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimatez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires PHYTOMED Strophanthinum comp. peut-il provoquer?

Aucun effet secondaire de PHYTOMED Strophanthinum comp. n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien, ou votre droguiste. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec PHYTOMED Strophanthinum comp. et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Instructions de stockage

Conserver à température ambiante (15–25°C).

Conservez hors de portée des enfants.

Pour les plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient PHYTOMED Strophanthinum comp.?

1 comprimé à 675 mg contient:

Principes actifs

Kalium carbonicum (HAB) D6 (HAB 7) 5 mg, Kalmia latifolia (HAB) D4 (HAB 7) 5 mg, Nitroglycerinum (Glonoinum) (HAB) D6 (HAB 7) 5 mg, Ouanbainum (g-Strophanthinum) D4 (HAB 5a, HAB 7) 5 mg, Selenicereus grandiflorus (HAB) D1 (HAB 7) 5 mg, Spigelia anthelmia (HAB) D4 (HAB 7) 5 mg.

Excipients

Lactose monohydraté 628 mg, amidon de maïs, talc, stéarate de magnésium.

Numéro d'autorisation

47721 (Swissmedic)

Où obtenez-vous PHYTOMED Strophanthinum comp.? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballage à 100 comprimés.

Titulaire de l'autorisation et fabricant

PHYTOMED AG, CH-3415 Hasle/Burgdorf

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Come usare PHYTOMED Strophanthinum comp.?

Salvo diversa prescrizione medica, adulti: lasciar sciogliere in bocca 1–2 compresse 3 volte al giorno e in caso di disturbi acuti, 1 compressa ogni 15 minuti, massimo 12 volte al giorno.

Nei bambini e negli adolescenti ai 18 anni, il medicamento può essere utilizzato solo previa consultazione con il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere PHYTOMED Strophanthinum comp.?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di PHYTOMED Strophanthinum comp. Se comunque osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere. Con l'assunzione di medicamenti omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con PHYTOMED Strophanthinum comp. e informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15–25°C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene PHYTOMED Strophanthinum comp.?

1 compressa à 675 mg contiene:

Principi attivi

Kalium carbonicum (HAB) D6 (HAB 7) 5 mg, Kalmia latifolia (HAB) D4 (HAB 7) 5 mg, Nitroglycerinum (Glonoinum) (HAB) D6 (HAB 7) 5 mg, Ouanbainum (g-Strophanthinum) D4 (HAB 5a, HAB 7) 5 mg, Selenicereus grandiflorus (HAB) D1 (HAB 7) 5 mg, Spigelia anthelmia (HAB) D4 (HAB 7) 5 mg.

Sostanze ausiliarie

Lattosio monoidrato 628 mg, amido di mais, talco, magnesio stearato.

Numeri dell'omologazione

47721 (Swissmedic)

Dove è ottenibile PHYTOMED Strophanthinum comp.? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica. Confezione da 100 compresse.

Titolare dell'omologazione e fabbricante

PHYTOMED AG, CH-3415 Hasle/Burgdorf

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2023 dall'autorità competente in materia di medicamenti (Swissmedic).



PHYTOMED AG | CH-3415 Hasle/Burgdorf



PHYTOMED AG | CH-3415 Hasle/Burgdorf



PHYTOMED AG | CH-3415 Hasle/Burgdorf